

住院手術衛教

一、手術前準備：

1. 手術前檢查:包含抽血、心電圖、胸部 X 光片。
2. 手術前一天可以正常飲食，並依照醫師的指示時間禁食。
3. 填寫手術同意書、麻醉同意書、自費同意書。
4. 手術當天請去除指甲油並將活動假牙、眼鏡、項鍊、戒指、手鐲等飾品拿下。
5. 當所有檢查及同意書都準備完畢後，換上手術衣，護理人員將幫您打上留置靜脈導管（點滴），以及確認手術部位並畫上標記。
6. 進開刀房前，再次確認身上物品已取下，並將內衣內褲脫掉，請先行解小便，排空膀胱。

三、手術後注意事項

1. 手術麻醉後，需平躺和禁食 6 小時。
2. 開始進食後，請先試喝水，若無頭暈或嘔吐等情形，則可恢復正常飲食。
3. 手術後，依醫師指示開立止痛藥，若嚴重疼痛不適且疼痛無法改善請立即告知醫護人員。
4. 手術後傷口請保持乾燥勿碰水，勿自行將紗布移除，我們每日會傷口換藥，同時觀察傷口滲液狀況、手術部位末梢的皮膚顏色、溫度及疼痛情形。
5. 手術後若有放置傷口引流管，這是為了使傷口內的積血引流出來，並降低術後腫脹不適而放置；通常將會放置約 3~4 天，上下床活動並無限制，請遵照護理師的教導，保持傷口引流管固定通暢，避免壓迫扭曲造成阻塞以及避免拉扯到引流管，以免管路滑脫。
6. 手術部位可用冰枕冰敷減輕腫脹疼痛。使用冰枕時間 15-20 分鐘後，休息 30-60 分鐘；若皮膚麻木、疼痛、灰白色時應停止冰敷。

住院手術衛教

7. 使用枕頭抬高患肢，以減輕腫脹，促進循環。
8. 手術部位如有石膏夾板或石膏固定，必須保持乾燥。石膏內的皮膚發癢時，請告知醫護人員，千萬不可試著插入任何東西到石膏裡面抓癢，以免造成破皮感染。
9. 若您未放置導尿管且手術後 8 小時仍未解小便，請主動告知護理人員。
10. 手術後的活動：
 - (1). 手術後的第一天若無特別禁忌以及無頭暈等不適情形，即可坐起活動；下床活動時，需有人從旁協助，避免因姿勢性低血壓而跌倒。
 - (2). 未手術的部位可活動，以防肌肉關節僵硬萎縮。
 - (3). 手術肢體可活動的範圍請醫師指示執行。
11. 下肢手術如有需要使用助行器輔助行走時，直到完全康復的期間，需依醫囑使用助行器輔助行走，使用時間依病人復原快慢而有所不同，需在醫師同意與指示下才可以改變助行器的使用方法。一般助行器使用期間大約是一至二個月。

四、居家照護

1. 出院後傷口請保持乾燥勿碰水，勿自行更換傷口紗布，直到下次返診。
2. 手術部位如有石膏夾板或石膏固定，必須保持乾燥勿碰水，切勿自行拆除。
3. 按時服用醫師所開立的口服藥，並定期返診，若傷口有紅腫熱痛、異常出血、分泌物過多時、疼痛加劇、發燒、呼吸喘、胸痛…等，請立即返回醫院就醫。